

المستقيمات والمستويات في الفضاء

1) كيف يمكن تعيين معادلة ديكارتية لمستوى؟ منهجية وطريقة

- 1- إذا كنا نعرف شعاع ناظمي $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ ونقطة A من المستوى (P) فإن المعادلة الديكارتية هي على الشكل :
- 2- إذا كنا نعرف ثلاث نقط A ، B و C :
- أ) نتحقق أن النقط الثلاثة ليست في استقامة.

ب) نعين شعاع ناظمي $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ على المستوى (ABC) حيث: $\vec{AB} \cdot \vec{n} = 0$ و $\vec{AC} \cdot \vec{n} = 0$

- تمرين 1** 1) عين معادلة ديكارتية للمستوي (P) حيث $\vec{n} (1; -3; 0)$ شعاع ناظمي ويشمل النقطة $A (1; -4; 2)$.
- 2) عين معادلة ديكارتية للمستوي (P') الموازي للمستوي ذو المعادلة $-3x + y - z + 7 = 0$ ويشمل النقطة $A (0; 2; -2)$.
- 3) عين معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) حيث $A (-1; 3; 2)$ ، $B (-4; 0; 1)$ ، $C (1; 2; -1)$

2) كيف يمكن تعيين تمثيل وسيطي لمستقيم؟ منهجية وطريقة

إن كنا نعرف نقطة $A (x_A; y_A; z_A)$ وشعاع توجيه $\vec{u} (a; b; c)$ لمستقيم (D) من الفضاء فإن التمثيل الوسيطي للمستقيم (D) يكون: $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$$

- تمرين 2:** نعتبر النقط $A (0; 1; -1)$ ، $B (4; -1; -3)$ ، $C (-1; -1; -1)$. أعط تمثيل وسيطي لـ:
- 1) المستقيم (AB) . 2) للقطعة $[AC]$ 3) لنصف المستقيم $[BC)$.

3) كيف يمكن تعيين تقاطع مستويين؟ منهجية وطريقة

- ليكن \vec{n} و $\vec{n'}$ شعاعين ناظميين على الترتيب للمستويين (P) و (P') .
- 1- إذا كان \vec{n} و $\vec{n'}$ مرتبطين خطيا فإن (P) و (P') متوازيان .
- أ) نعين النقطة A من (P) ، إذا كانت A تنتمي إلى (P') فإن (P) و (P') منطبقان .
- ب) إذا كانت A لا تنتمي إلى (P') فإن (P) و (P') متوازيان تماما .
- 2- إذا كان \vec{n} و $\vec{n'}$ غير مرتبطين خطيا فإن (P) و (P') متقاطعان وفق مستقيم .
- نحل جملة معادلتين المستويين (P) و (P') ونعين تمثيلا وسيطيا لمستقيم تقاطع المستويين .
- تمرين 3:** نعتبر المستويات (P_1) ، (P_2) و (P_3) ذات المعادلات :

$$(P_1): x + 3y - z + 1 = 0, (P_2): x + 4y + z - 3 = 0 \text{ و } (P_3): -x - 3y + z + 2 = 0$$

ادرس تقاطع (P_1) و (P_2) ثم (P_1) و (P_3) .

4) كيف يمكن تعيين تقاطع مستقيمين؟ منهجية وطريقة

- ليكن \vec{u} و $\vec{u'}$ شعاعا توجيه المستقيمين (D) و (D') على الترتيب
- 1- إذا كان \vec{u} و $\vec{u'}$ مرتبطين خطيا فإن (D) و (D') متوازيان

أ - نعين النقطة A من (D) ، إذا كانت A تنتمي إلى (D') فإن (D) و (D') منطبقان

ب - إذا كانت A لا تنتمي إلى (D') فإن (D) و (D') متوازيان تماما

2- إذا كان \vec{u} و \vec{u}' غير مرتبطين خطيا فإن (D) و (D') متقاطعان في نقطة أو لا ينتميان إلى نفس المستوي .

تمرين 4 : لتكن المستقيمات (D_1) ، (D_2) و (D_3) المعينة بتمثيلاتها الوسيطة :

$$(D_3): \begin{cases} x = -7 + 7k \\ y = 4 - 3k \\ z = -1 + 2k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}) \quad \text{و} \quad (D_2): \begin{cases} x = 1 + t' \\ y = -1 - 2t' \\ z = 3 + t' \end{cases} \quad (t' \in \mathbb{R}) , \quad (D_1): \begin{cases} x = t \\ y = 1 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

عين تقاطع كل من المستقيمات (1) (D_1) و (D_2) ، (2) (D_2) و (D_3) ، (3) (D_1) و (D_3) .

5 كيف يمكن تعيين تقاطع مستوى ومستقيم؟

منهجية وطريقة

ليكن \vec{u} شعاع توجيه للمستقيم (D) و \vec{n} شعاعا ناظميا للمستوي (P)

(1) إذا كان $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ فإن (D) و (P) متوازيان .

أ - نعين النقطة A من (D) ، إذا كانت A تنتمي إلى (P) فإن (D) محتوى في (P) .

ب - إذا كانت A لا تنتمي إلى (P) فإن (D) و (P) متوازيان تماما .

(2) إذا كان $\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$ فإن (D) و (P) متقاطعان في نقطة ، نعوض بالإحداثيات الوسيطة للمستقيم (D) في

معادلة المستوي (P) فنحصل على قيمة للوسيط تسمح لنا بتعيين إحداثيات نقطة التقاطع

تمرين 5: ليكن المستوي (P) ذو المعادلة $x - y + z = 5$ والمستقيمان (D) و (D') حيث

$$(D): \begin{cases} x = -8 + 2t \\ y = -4 + t \\ z = 9 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{و} \quad (D'): \begin{cases} x = -8 + 2t \\ y = 6 - t \\ z = 9 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

عين تقاطع المستقيم (D) و المستوي (P) ثم عين تقاطع (D') و المستوي (P) .

تمرين 6: ليكن المستوي (P) ذو المعادلة $x + 2y + z - 4 = 0$ و النقطة $A(1; 0; -2)$.

(1) عين شعاع ناظمي \vec{n} على المستوي (P) .

(2) أعط تمثيلا وسيطيا للمستقيم (D) الذي يشمل A والعمودي على المستوي (P) .

(3) استنتج إحداثيات النقطة H المسقط العمودي للنقطة A على المستوي (P) .

6 كيف يمكن تعيين تقاطع ثلاث مستويات ؟

منهجية وطريقة

(1) إذا كان مستويان متوازيان تماما فإن $S = (p_1) \cap (p_2) \cap (p_3) = \emptyset$.

(2) إذا كان كل مستويين غير متوازيين نعين مستقيم (D) تقاطع (p_1) و (p_2)

أ) إذا كان : $(D) \subset (p_3)$ فإن : $S = (p_1) \cap (p_2) \cap (p_3) = (D)$

ب) إذا كان : $(D) \cap (p_3) = \{A\}$ فإن : $S = (p_1) \cap (p_2) \cap (p_3) = \{A\}$

ج) إذا كان (D) و (p_3) متوازيين تماما فإن : $S = (p_1) \cap (p_2) \cap (p_3) = \emptyset$

تمرين 7:

لنعتبر المستويات (p_1) ، (p_2) و (p_3) ذات المعادلات:

$$(P_1): x + y + z = 0 , (P_2): -2x + y - z + 5 = 0 \text{ و } (P_3): x - 5y - z - 10 = 0$$

عين تقاطع المستويات (p_1) ، (p_2) و (p_3) .

تم نشر هذا الملف بواسطة قرص **تجربتي** مع الباكالوريا

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jjel.tk/bac